


ТЕХНІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО ТИСКУ НА РАНУ

Коваленко С.І.





Алгоритм надання домедичної допомоги при масивній кровотечі

- 1. Оцінити безпеку
- БЕЗПЕКА – коли тобі нічого не загрожує
- НЕБЕЗПЕКА – це коли щось загрожує твоєму життю чи здоров'ю

ЗАГРОЗА



- Контейнери помарковані спеціальними знаками.
- Розлите пальне
- Дим, вогонь
- Запах природного чи іншого газу
- Оголені дроти електричного струму
- Предмети, що можуть впасти зверху

Якщо потрапив у небезпечну ситуацію:

- Заспокоїтись, оцінити ситуацію, спланувати свої подальші дії
- Оцінити власне самопочуття
- Зателефонувати до рятувальних служб або спробувати подати сигнал про своє місцезнаходження
- Визначити безпечні шляхи евакуації або безпечне місцезнаходження до приїзду рятувальних служб

Засіб перев'язувальний гемостатичний

КРОВ+СТОП

ШВИДКЕ ТА ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗУПИНКИ МАСИВНИХ КРОВОТЕЧ

Зупинка зовнішньої кровотечі різної інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих венозних та артеріальних судин. В умовах стаціонару - для зупинки кровотечі з паренхіматозних органів.



Інструкція по застосуванню:


1. Очистити рану від чужорідних тіл і крові бинтом (малюнок 1).
2. Розкрити пакет, засипати порошок як можна ближче до джерела кровотечі (малюнок 2).
3. Поверх засипаного порошку накласти ватно-марлеву пов'язку або тампон, за відсутності - щільну тканину (малюнок 3).
4. Здійснити ручну компресію (малюнок 4).
5. Не витягаючи препарату, накласти пов'язку, що давить.
6. При пошкодженні великих судин кінцівок виконати транспортну іммобілізацію.
7. Накласти провізорний джгут вище рани не затягуючи його.
8. Евакуювати потерпілого в стаціонар.
9. При поновленні кровотечі накласти джгут.



Офіційний представник виробника
ТОВ «Формед»
Київ, вул. Декабристів, 3, оф. 301
Тел.: +38 044 500 16 72, 361 80 25
Моб.: +38 067 230 11 61, 050 011 84 09
www.gemostop.at.ua

Якщо місце безпечне, то діяти за алгоритмом АВС


- А – Тривога (покликати на допомогу інших людей або зателефонувати 103 або 112)
- В – Кровотеча (забезпечити доступ до рани, визначити місце кровотечі (якщо в рані застрягло стороннє тіло, не виймайте його)
- С – Притисни (закрити рану чистою тканиною і натиснути з максимальною силою не менше 3-х хвилин, в цей час підготувати інші кровоупинні засоби і обміркувати подальші дії)



- Якщо , внаслідок прямого тиску на рану, кровотеча зупинилась або кровотеча незначна – накладіть компресійну пов'язку
- Можна запропонувати травмованому самому здійснити тиск на рану, якщо його стан дозволяє це робити

Зупинка кровотечі з рани
тулуба за допомогою
гемостатичних засобів

IV



Туго затампуйте рану
серветкою з гемостатиком.

- Якщо кровотеча триває, а рана велика й глибока, спробуйте затампувати – «заповнити» рану тканиною, бинтом або накладіть ще компресійну пов'язку.

ЗАСОБИ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ

СІЧ-турнікет





CAT - турнікет



Джгут Есмарха



Місця накладання джгута або турнікета



Правила накладання джгута

1. Накладають при травмуванні крупних артерій на верхню і нижню третину плеча, середню і нижню третину стегна. При артеріальній кровотечі – вище місця кровотечі, а при венозній – нижче.
2. Кінцівку в місці накладання джгута обгортають марлею, рушником чи іншою тканиною, підіймають. Джгут розтягують і роблять ним 2-3 оберти навколо кінцівки.
3. Якщо джгут накладено правильно – кінцівка бліда, пульс нижче місця накладання зникає і кровотеча спиняється.
4. Термін накладання джгута: в теплих умовах – до 2-х годин, у прохолодних – до 1-1,5 години.
5. Через кожні 30 хвилин послабляти джгут. Під джгутом обов'язково залишають записку з точно зазначеним часом накладання джгута.
6. Кінцівку з накладеним джгутом при холодних умовах утеплюють.
7. У разі відсутності джгута накладають закрутку.